

ORASEPT % 0.2 GARGARA

Birim Formülü:

Klorheksidin glukonat 2mg/ml içerir.

Tıbbi Özellikleri:

Orasept Gargara'nın etken maddesi olan klorheksidin glukonat bakterisid etkili katyonik bir antiseptiktir. Düşük konsantrasyonda bakteriyostatik, yüksek konsantrasyonda bakterisid etki gösterir.

Klorheksidin glukonat, pozitif yüklü olduğundan, ağız çalkalanması sırasında negatif bir yüke sahip olan diş, plak ve oral mukoza yüzeylerine ve hücre içi bileşenlerin zayıflamasına neden olan mikroorganizmaların hücre duvarı üzerine absorbe olarak bakteri hücre membranının parçalanmasına neden olur. Klorheksidin glukonat emildiği bu yerlerden 24 saat süresince kademeli olarak salınır. Bu salınma bakteriyostatik etkinin devamını sağlar.

Farmakokinetik çalışmalar, çalkalamayı takiben klorheksidin glukonatın yaklaşık % 30'unun oral kavitede kaldığını ve ağızdaki sıvılar içerisine yavaş yavaş salındığını göstermiştir.

Klorheksidin glukonatın gastrointestinal kanaldan emilimi çok zayıftır. Klorheksidin glukonatın % 90'ı vücuttan feçes ile, % 1'den az bir oranda ise idrarla atılır.

Önerilen Kullanım Yeri:

- Dental plakların oluşumunu önleme,
- Orofarenks bölgesi enfeksiyonlarının (farenjit, larenjit, tonsillit vb.) giderilmesine ve bu bölgelerdeki operasyonlar sonrasında,
- Gingivitis, akut nekrotize ülseratif gingivitis, akut streptokokal gingivitis, akut herpetik gingivo-stomatitis'in giderilmesi ve profilaksisine,
- Ağız içi protezlerin neden olduğu bakteriyel veya fungal oral mukoza enflamasyonlarının (stomatitis) giderilmesine,
- Minör aft ülserlerinin (Aphthous stomatitis) giderilmesine,
- Dental girişim öncesi ve sonrasında ağızda antiseptik ortam yaratmak amacıyla,
- Çeşitli nedenlerle diş temizliği yapamayan kişilerde (immuno-kompromize hastalarda, periodontal veya diğer oral operasyonları geçirmiş kişiler, mental ya da fiziksel özürlü kişiler gibi) ağız hijyeninin sağlanması amacıyla,
- Kemoterapi ve radyoterapi sonrası ağızda görülen mukozitlere bağlı sekonder enfeksiyonların profilaksisine yardımcı olarak kullanılır.

Kullanılmaması gereken durumlar:

Preparatın bileşiminde bulunan maddelerden birine aşırı duyarlılığı olanlarda kullanılmamalıdır.

12 yaşın altındaki çocuklarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar / Önlemler:

- Kullanmadan önce Kullanım Kılavuzu’nu dikkatle okuyunuz.
- Kullanmakta olduğunuz ilaç varsa, mutlaka doktorunuza ve eczacınıza bildirin.
- 12 yaş ve üzerindeki çocuklarda doktor tavsiyesiyle kullanılmalıdır.
- Haricen kullanılır. Kesinlikle yutulmamalıdır.
- Sulandırılmadan kullanılır.
- Sadece ağız içinde kullanılır, gözler ve kulaklar ile temas etmesinden kaçınılmalıdır. Ayrıca beyine, meninkslere temastan kaçınılmalıdır.
- Ağız içinde, dil ve diş üzerinde geri dönüşümlü renk değişikliği yapabilir.
- Gebelik ve laktasyonda kullanımı: Orasept Gargara’nın gebelikte ve laktasyonda kullanımına hekim karar vermelidir.
- Kaza ile yutulduğunda su ve süt verilerek seyreltme işlemi yapılarak bir doktora başvurunuz.

Yan etkiler / Advers etkiler:

Klorheksidin ağız içinde, dil ve dişler üzerinde renk değişikliklerine neden olabilir.

Klorheksidin kullanımı kesildikten sonra ağız ve dildeki renk değişikliği kendiliğinden ortadan kalkar.

Yüzeyi pürüzlü diş dolguları ve pürüzlü diş yüzeyleri daha fazla boyanırlar ve böylece renk değişikliği gözlenir.

Diş yüzeyindeki renk değişiklikleri hastaların diş macunları ile ağız temizliği yapabilecekleri duruma gelmeleriyle büyük çapta ortadan kaldırılır.

Pürüzlü diş yüzeyleri ve pürüzlü dolgularda kalan renk değişiklikleri diş hekimi tarafından kolaylıkla giderilebilir.

Nadiren bazı hastalarda klorheksidin glukonat gargara ile tedavi sırasında tat almada değişiklikler oluşabilir.

Tat alma duyusundaki değişikliklerin devamlı olduğu bir olgu bildirilmemiştir.

Orasept Gargara kullanımında aşağıdaki etkiler sürekli olarak devam ediyor veya günlük yaşamı etkileyecek kadar rahatsızlık veriyorsa hekime başvurulabilir:

- Tat almada değişiklik,
- Tartar (calculus) oluşumunda artış,
- Dişlerde, ağızda, diş dolgusunda, protezlerde ve ağızdaki diğer apareylerde oluşan renk değişikliğinin hastaların yaptığı mekanik temizliğe rağmen geçmemesi.

İstenmeyen bir etki görüldüğü zaman Sağlık Bakanlığı Türkiye Farmakovijilans Merkezine (TÜFAM) bildiriniz!

Günlük Kullanım Şekli ve Dozu:

Orasept Gargara günde 2 kez, dişler iyice fırçalandıktan sonra 10-15 ml (bir ölçek) kadar ağıza alınarak yaklaşık 1 dakika süresince çalkalanır.

İlacı kullandıktan sonra 30 dakika boyunca ağız suyla çalkalanmamalı, bir şey yiyip içilmemelidir.

Diş protezlerinin temizliği için, protezler günde 2 kez 1-2 dakika **Orasept Gargara** içinde bekletilir. Ancak bu işlemden önce, protez yüzeyindeki renklenme potansiyeli olan glikoproteinlerin iyice temizlenmesi gerekir.

Ticari Takdim Şekli:

200ml'lik PET şişelerde, ölçü kadehi ile birlikte.

İzin Sahibi ve Adresi:

Casel Ecz. Cahit Selimoğlu İlaç San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Nadide Sokak No: 5 Merter – İstanbul

Üretici İsim ve Adresi:

Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
Akpınar Mah. Fatih Cd. No: 2
Samandıra / Kartal – İstanbul

25°C'nin altındaki oda sıcaklığında, çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.

SADECE ECZANELERDE SATILIR.